# Nouveaux Coléoptères de la République Argentine

PAR M. PIC

**Anthicus singularis** n. sp. Elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, fortiter et sparse punctatus, nigro-piceus, elytris subaeneis, membris testaceis.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise couchée assez longue avec quelques rares poils dressés et orné, en dessus, d'une ponctuation générale forte et espacée, noir de poix, les élytres à reflets métalliques un peu bronzés, membres testacés. Tête grosse, subtronquée en arrière avec les yeux petits, très éloignés du bord postérieur; antennes peu longues, subfiliformes; prothorax assez long, dilaté-arrondi en avant, non rebordé ni étranglé à la base, de la largeur de la tête en avant; écusson petit, roussâtre; élytres un peu allongés, à épaules nulles, largement tronqués au sommet, à ponctuation espacée s'effaçant en arrière; pygidium débordant un peu les élytres, foncé, bordé de roux; cuisses un peu epaissies, tibias plus minces à la base.

Long.: 3 mill. environ. Rép. Argentine: Gob. de los Andes. (C. Bruch, in coll. Bruch.)

Espèce des plus distinctes par sa forme particulière, mimant les *Anthilephilus* Laf., mais avec les cuisses simples et relativement minces.

**Anthicus myrmecophilus** n. sp. Oblongus, nitidus, sparse hirsutus, rufus, capite nigro-piceo, elytris post medium transverse nigro fasciatis, ad basin nigro notatis aut vage et paulo brunnescentibus.

Oblong avec les élytres un peu élargis, brillant, orné de poils clairs espacés et redressés, roux avec la tête foncée et les élytres munis d'une large bande postmédiane transversale noire, avec la base foncée, ou simplement un peu rembrunie près de l'écusson. Tête assez

grosse, subarquée en arrière, peu ponctuée; antennes assez longues, un peu épaissies au sommet; prothorax assez long, dilaté-arrondi en avant, à base courtement droite, un peu plus étroit que la tête, ayant quelques gros points; élytres bien plus larges que le prothorax, dilatés vers le milieu, atténués postérieurement, subarrondis au sommet, un peu déprimés en avant et ornés de quelques points épars; pattes assez longues.

Long.: 2 mill. environ. Rép. Argentine. Prov. de Buenos Aires. (C. Bruch, in coll. Bruch et Pic.)

Espèce myrmecophile se trouvant avec *Solenopsis saevissima* var. *Richteri* For.

Peut se placer près de A. c r u x F. G., très différent par son avant-corps, notamment par le prothorax, plus étroit, les élytres à côtés nos parallèles et dessins différents.

**Phrixothrix Bruchi** n. sp. Elongatus, nitidus, hirsutus, testaceus, capite late piceo (forma typica) aut rufescente (v. differens), antennis pro parte brunnescentibus, elytris in disco paulo brunnescentibus (forma typica), aut brunnescentibus et apice paulo testaceis (v. differens), elongatis, dehiscentibus, lateraliter longe impressis.

Allongé, brillant, revêtu d'une pubescence assez courte semi dressée, en majeure partie claire, testacé avec les antennes diversement rembrunies, ainsi que les élytres, la tête étant, chez forme fype, largement foncée. Tête assez grosse, plus étroite, que le prothorax, brillante, à ponctuation espacée entre les yeux, celle-ci est tantôt largement foncée avec la partie antérieure rousse (forme type), tantôt testacé roussâtre (var. differens). Antennes pas très longues, à rameaux longs, d'ordinaire presque toutes rembrunies, ou bien en majeure partie testacées; prothorax court et large, un peu retréci et arqué en avant, brillant, finement et éparsément ponctué; écusson presque carré, à ponctuation forte et écarté; élytres à peine plus larges que le prothorax, longs, très déhiscents, acuminés à l'extrémité, ornés d'une impression allongée latérale, brillants, irrégulièrement ponctués, plus ou moins rembrunis au milieu, suture brune (v. differens) ou plus claire (forme type) avec le sommet subopaque et plus clair; ailes claires ou un peu enfumées; dessous et pattes testacées.

Long.: 10-13 mill. Rép. Argentine. (Coll. Bruch et Pic.)

Forme type: Córdoba: Cabana 1, 1926. (C. Bruch.)

*Variété differens.* Tucumán. (C. S. Reed.)

Ressemble un peu à *P. hirtus* E. Ol., en autre de la taille moindre, en diffère par la tête moins large, les mandibules moins longues, les élytres plus claires à leur extrémité.